

子どもの定期予防接種

予防接種は、お子さんの病気に対する抵抗力をつけるため、接種できる時期になったら忘れずに受けましょう。接種をする際は、「予防接種と子どもの健康」をよく読んでおいてください。

医療機関へは必ず予約してからお出かけください。

- 接種対象者 次の2つの条件を満たす方
- ① 諏訪市に住民登録のある方
 - ② 接種日時点で対象年齢内の方
- 接種場所 予防接種実施医療機関 (P19・20)

- 接種費用 無料
- 持ち物
- ① 各ワクチンの予診票
 - ② 母子健康手帳
 - ③ マイナ保険証または資格確認書

※乳幼児期(日本脳炎1期追加まで)に受ける予防接種の予診票は、赤ちゃん訪問時にお渡しする予防接種手帳につづられています。

●定期予防接種の種類とスケジュール

■注射生ワクチン同士は接種してから27日以上の間隔を空けてください。 ■丸囲み数字(①、②など)は、接種の回数を示しています(例 ②→2回目)。

予防接種の種類	対象年齢	標準的な接種スケジュール(おおすすめの接種時期)																					
		2 か 月	3 か 月	4 か 月	5 か 月	6 か 月	7 か 月	8 か 月	11 か 月	12 か 月	15 か 月	17 か 月	18 か 月	23 か 月	2 歳	3 歳	4 歳	5 歳	6 歳	7 歳	8 歳	9 歳	10歳以上
経口生ワクチン ロタウイルス	ロタリックス(1価) ロタテック(5価)	出生6週0日後～24週0日後まで	①	②																			
		出生6週0日後～32週0日後まで	①	②	③																		
不活化ワクチン 小児用肺炎球菌		生後2か月～5歳未満	①	②	③					④													
不活化ワクチン B型肝炎		1歳未満	①	②				③															
不活化ワクチン 五種混合 (ジフテリア・百日せき・破傷風・ポリオ・Hib)		1期:生後2か月～7歳6か月未満	①	②	③						④												
不活化ワクチン 四種混合 ※1 (ジフテリア・百日せき・破傷風・ポリオ)			①	②	③	五種混合を接種した方は接種する必要はありません。																	
不活化ワクチン 二種混合(ジフテリア・破傷風)		2期:11歳～13歳未満																					11～12歳①
不活化ワクチン ヒブ ※1 (インフルエンザ菌b型)		生後2か月～5歳未満	①	②	③						④												小6相当の方へ個別通知します
		五種混合を接種した方は接種する必要はありません。																					
注射生ワクチン BCG(結核)		1歳未満				①																	
注射生ワクチン 麻しん・風しん		1期:1歳～2歳未満 2期:小学校就学前1年の間										①											年長② 年長相当の方へ個別通知します
注射生ワクチン 水痘(水ぼうそう)		1歳～3歳未満									①		②										
不活化ワクチン 日本脳炎		1期:3歳～7歳6か月未満 2期:9歳～13歳未満 ※特例措置があります。															①						9～12歳④ 小4相当の方へ個別通知します
																②	③						
不活化ワクチン 子宮頸がん		小学校6年生～ 高校1年生相当の女子																					中学1年生 ①②③ 中1相当の女子へ個別通知します

※1 四種混合とHibをすでに接種されている方は、五種混合ではなく原則として同一種類のワクチンを接種してください。

● 定期予防接種の対象年齢・回数・接種間隔

種 類		接 種 対 象 年 齢	接 種 回 数		標 準 的 な 接 種 方 法
			接種開始時年齢		
ロタウイルス ※いずれかを選択して接種	ロタリックス(1価)	出生6週0日後～24週0日後まで	1回目は出生6週0日後～14週6日後まで	2回	27日以上の間隔をおいて2回接種
	ロタテック(5価)	出生6週0日後～32週0日後まで		3回	27日以上の間隔をおいて3回接種
小児用肺炎球菌		生後2か月～5歳未満 ※接種開始時期で接種回数が変わります。	生後2か月～7か月未満	初回3回 追加1回	1歳未満までに、27日以上の間隔をおいて3回接種 3回目接種後、60日以上の間隔をおいて1歳以降に接種
			生後7か月～1歳未満	初回2回 追加1回	1歳未満までに、27日以上の間隔をおいて2回接種 2回目接種後、60日以上の間隔をおいて1歳以降に接種
			1歳～2歳未満	2回	60日以上の間隔をおいて2回接種
			2歳～5歳未満	1回	—
B型肝炎		1歳未満	—	3回	生後2か月～8か月までに、27日以上の間隔をおいて2回接種 1回目から139日以上の間隔をおいて1回接種
五種混合(ジフテリア・百日せき・破傷風・ポリオ・Hib)	生後2か月～7歳6か月未満		—	初回3回	中20日～56日以上の間隔をおいて3回接種
追加1回				3回目接種後、(五混)6か月～1年6か月※2(四混)1年～1年6か月の間隔をおいて接種	
1回				平成25年4月2日～平成26年4月1日生の方に5月頃個別通知します(小6相当)	
四種混合(ジフテリア・百日せき・破傷風・ポリオ)※1		11歳～13歳未満			
二種混合(ジフテリア・破傷風)					
ヒブ※1(インフルエンザ菌b型)		生後2か月～5歳未満 ※接種開始時期で接種回数が変わります。	生後2か月～7か月未満	初回3回 追加1回	1歳未満までに、27日以上の間隔をおいて3回接種 3回目接種後、7か月以上の間隔をおいて接種
			生後7か月～1歳未満	初回2回 追加1回	1歳未満までに、27日以上の間隔をおいて2回接種 2回目接種後、7か月以上の間隔をおいて接種
			1歳～5歳未満	1回	—
BCG(結核)		1歳未満	—	1回	生後5か月～7か月までに接種
麻しん・風しん	第1期	1歳～2歳未満	—	1回	—
	第2期	小学校就学前1年の間(年長児相当)	—	1回	平成31年4月2日～令和2年4月1日生の方に4月頃個別通知します(年長相当) ※令和7年4月1日～令和8年3月31日の間に接種
水痘(水ぼうそう)		1歳～3歳未満	—	2回	6か月以上の間隔をおいて2回接種
日本脳炎	第1期	3歳～7歳6か月未満	—	初回2回 追加1回	中6日以上の間隔をおいて2回接種 2回目接種後、おおむね1年の間隔をおいて接種
	第2期	9歳～13歳未満	—	1回	平成27年4月2日～平成28年4月1日生の方に5月頃個別通知します(小4相当)
	第2期(特例措置)	平成17年4月2日～19年4月1日生でかつ20歳未満の方	—	1回	対象者には令和6年度までに予診票をお送りしています。予診票を紛失、転入された方はお問い合わせください。
子宮頸がん(HPV)		●定期接種 小学校6年生～高校1年生相当の女子 ※中学1年生相当(平成24年4月2日～平成25年4月1日生)の女子に個別通知します(5月頃)	—	3回	■2価ワクチン【サーバリックス】 2回目:1回目から1か月以上の間隔をおいて接種 3回目:1回目から5か月以上かつ2回目から2か月半以上の間隔をおいて接種
			15歳未満	2回	■4価ワクチン【ガーダシル】 ■9価ワクチン【シルガード9】 2回目:1回目から1か月以上の間隔をおいて接種 3回目:2回目から3か月以上の間隔をおいて接種 9価ワクチンを15歳になるまでに1回目の接種をした場合は2回接種 2回目:1回目から6か月以上の間隔をおいて接種

※1 四種混合とHibをすでに接種されている方は、五種混合ではなく原則として同一種類のワクチンを接種してください。 ※2 日本小児科学会は、4回目の接種は1歳以上での接種を推奨しています。