

令和2年10月1日から「ロタウイルスワクチン」は予防接種法に基づく「定期接種」になります。

重症胃腸炎の予防のため ロタウイルスワクチンを接種しましょう！

●ロタウイルスワクチン定期接種の対象は、


令和2年8月1日以降に生まれ、10月1日以降に接種するお子さんです。

※9月30日までに接種をした場合、任意接種（費用は自己負担）となりますのでご注意ください。

●ワクチンの接種回数と間隔 ★14週6日（約3か月と10日）までに初回の接種を

ロタウイルスワクチンは2種類あり、どちらも生ワクチン（弱毒化したウイルス）で予防効果や安全性に差はありませんが、**接種回数が異なります**。なお、**途中からワクチンの種類を変更することはできません**ので、最初に接種したワクチンを2回目以降も接種します。**初回の接種を生後14週6日までにに行います（生後6週から接種できます）**。生後15週以降の初回接種はおすすめしていません。

ワクチン名	ロタリックス(1価)	ロタテック(5価)
接種時期	出生6週0日後から 出生24週0日後 ※初回接種は、出生14週6日後までに行ってください。	出生6週0日後から 出生32週0日後
接種回数	2回 経口接種 (27日以上の間隔をあける)	3回 経口接種 (27日以上の間隔をあける)
接種量	1.5 ml	2 ml
接種後、 特に注意する事	どちらのワクチンも、接種後（特に1～2週間）は腸重積症（後述）の症状に注意し、 症状が見られた際には、すみやかに接種した医療機関を受診してください。	



※1回目は、生後6週から生後14週6日までに受けてください。
※2回目以降は、27日以上の間隔をあけますが、できるだけ早く接種を完了しましょう。




●接種後1～2週間は「腸重積症」に注意しましょう

- 腸重積症は、腸の一部が隣接する腸管にはまり込む病気で、速やかな治療が必要です。
- ワクチンの接種に関わらず、3か月～2歳くらいまでの赤ちゃんがかかりやすい病気です。
- ワクチン接種後（特に初回接種後）1～2週間くらいの間は、かかりやすくなると報告されています。
- 次のような様子が一つでも見られるときは、医療機関を受診しましょう。

□「突然はげしく泣く」 □「嘔吐を繰り返す」 □「便に血が混じる」
□「ぐったりして顔色が悪い」 □「機嫌が良かったり不機嫌になったりを繰り返す」

※月齢が進むと、腸重積症にかかりやすくなります。できるだけ腸重積症の起こりにくい早めの時期に接種を受けましょう。
初回接種を生後15週以降に受けることはお勧めしていません。



● ロタウイルス感染症とは

ロタウイルスによって引き起こされる急性の胃腸炎で、乳幼児期（0～6歳ころ）にかかりやすい病気です。主な症状は、水のような下痢、吐き気、嘔吐、発熱、腹痛です。ロタウイルスは感染力が強く、5歳までにほぼすべての子どもがロタウイルスに感染すると言われています。脱水症状がひどくなると入院治療が必要になることがあります。5歳までの急性胃腸炎の入院患者のうち、40～50%前後はロタウイルスが原因です。

● 接種方法

市内実施医療機関（下記）へ予約をしてください。

市外（県内）の医療機関で接種をご希望の方は、医療機関へ接種が可能であるか確認をしてください。

県外の医療機関で接種をご希望の方は、諏訪市保健センターへご連絡下さい。

● 持ち物

予診票、母子手帳（必ずお持ちください）、健康保険証

※予診票は3種類ありますので、接種回数に合わせた予診票を使って下さい。

● ワクチンを接種する前

赤ちゃんのお腹がいっぱいだと、上手にワクチンが飲めない場合がありますので、接種前30分ほどは授乳を控えることをおすすめします。上手に飲めるよう、医師、看護師の指示に従ってください。なお、ワクチンがうまく飲めなかったり、吐いたりしてしまった場合でも、わずかでも飲み込みが確認できていれば、ワクチンの効果に問題ありませんので、再度接種する必要はありません。

● ワクチンを接種した後

接種直後は、医療機関で30分ほど様子を見てから帰宅してください。ワクチン接種後2週間ほどは、赤ちゃんの便の中に、ワクチンのウイルスが含まれることがあります。おむつ交換の後など、ていねいに手を洗ってください。高熱、けいれんなど、異常を感じた場合は、すぐに医師の診察を受けてください。

● 接種できない場合

- ・過去にロタウイルスワクチンを接種した際に過敏症やそれを疑う症状のあった方
- ・先天性消化管障害を有する方
(治療が完了した場合は、接種を受けることができる可能性があるため、医師にご相談ください。)
- ・腸重積症にかかったことのある方
- ・重症複合型免疫不全（SCID）を有する方
- ・発熱している方 ・重篤な急性疾患にかかっている方等



● 諏訪市ロタウイルスワクチン定期接種 市内実施医療機関

医 療 機 関 名	住 所	電 話 番 号
あるがクリニック	諏訪市湯の脇二丁目6番3号	0266-78-1235
いちょう並木クリニック	諏訪市四賀2417番地2	0266-58-5522
こいけこどもクリニック	諏訪市諏訪一丁目6番1号アーケ諏訪2F	0266-75-5047
小児科ごとうクリニック	諏訪市上川三丁目2506番2	0266-58-1115
小松内科クリニック	諏訪市中洲245番地18	0266-53-7631
五味医院	諏訪市大手二丁目4番3号	0266-52-1126
諏訪赤十字病院（※かかりつけの方のみ）	諏訪市湖岸通り五丁目11番50号	0266-52-6111
諏訪豊田診療所	諏訪市大字豊田2434番地2	0266-52-1802
はやし小児科内科医院	諏訪市湖南大曲15	0266-53-7888
松本医院	諏訪市清水二丁目4番12号	0266-52-3247
宮坂医院	諏訪市元町4番10号	0266-52-1711
吉江内科医院	諏訪市渋崎1794番地1	0266-52-2525

■ 問い合わせ先 諏訪市役所健康推進課（諏訪市保健センター）
0266-52-4141（内線 591・592）